

リスト型 印刷 - Google Chrome

rc.owl-checker.com/owl/chkRezeptViewPrint.mics?print_opt2=KouhoByomei2

レビュー印刷

サポーター：宮崎内科医院

精密点検

外来 令和07年03月 国保

2025/03/24
09:28:47

カルテ番号：11945 国保

患者氏名：

糖尿病 H24.10.30

★ ペリキューボ錠 2. 5 mg 1錠

点 28回

高血圧症 H24.10.30

レセプト摘要欄に必要なコメントコードがありません。効能又は効果に関連する注意において、「左室駆出率の保たれた慢性心不全における本剤...

高コレステロール血症 H24.10.30

★ ペリキューボ錠 2. 5 mg 1錠

点 28回

骨粗鬆症 H25.03.14

レセプト摘要欄に必要なコメントコードがありません。効能又は効果に関連する注意において、「左室駆出率の保たれた慢性心不全における本剤...

低アルブミン血症 H27.05.20

【点検メッセージ】

ルールID OWLFLUGACMT002

適用可否

適用 適用外

閉じる

レセプト摘要欄への記載事項

項番 区分 診療行為名称等

144 ペリキューボ錠 2. 5 mg ペリキューボ錠 5 mg ペリキューボ錠 10 mg

効能又は効果に関連する注意において、「左室駆出率の保たれた慢性心不全における本剤の有効性及び安全性は確立していないため、左室駆出率の低下した慢性心不全患者に投与すること。」とされているので、投与開始に当たっては、左室駆出率の計測年月日及び左室駆出率の値を記載すること。なお、他の医療機関で左室駆出率を測定した場合には、当該測定結果及び医療機関名を記載することで差し支えない。

摘要欄に漏れコメントコードです。

850600082 左室駆出率の計測年月日（ペリキューボ錠 2. 5 mg 等）；（元号）yy

低ナトリウム血症 H29.12.26

閉じる

狭心症 H30.02.05

レセプト摘要欄に必要なコメントコードがありません。効能又は効果に関連する注意において、「左室駆出率の保たれた慢性心不全における本剤の有効性及び安全性は確立していないため、左室駆出率の低下した慢性心不全患者に投与すること。」とされているので、投与開始に当たっては、左室駆出率の計測年月日及び左室駆出率の値を記載すること。なお、他の医療機関で左室駆出率を測定した場合には、当該測定結果及び医療機関名を記載することで差し支えない。

腎性貧血 H30.06.21

閉じる

高リン血症 H30.08.20

閉じる

両側変形性膝関節症 R01.06.04

閉じる

甲状腺腫 R01.09.17

閉じる

慢性心不全 R04.11.02

閉じる

慢性腎不全 R05.08.07

閉じる

廃用性筋萎縮 R05.10.05

閉じる

高尿酸血症 R05.10.05

閉じる

膵炎 R05.10.05

閉じる

統合失調症 R05.10.30

閉じる

維持療法の必要な難治性逆流性食道炎 R05.12.01

閉じる

中等度アルツハイマー型認知症 R05.12.07

閉じる

高β2マイクログロブリン血症 R05.12.20

閉じる

リスト型 印刷 - Google Chrome

rc.owl-checker.com/owl/chkRezeptViewPrint.mics?print_opt2=KouhoByomei2

レビュー印刷

サポーター：宮崎内科医院

精密点検

外来 令和07年03月 国保

2025/03/24
09:28:47

カルテ番号：11945 国保

患者氏名：

糖尿病 H24.10.30

★ ペリキューボ錠 2. 5 mg 1錠

点 28回

高血圧症 H24.10.30

レセプト摘要欄に必要なコメントがありません。

高コレステロール血症 H24.10.30

830600083 左室駆出率の値（ペリキューボ錠 2. 5 mg 等）；*****

骨粗鬆症 H25.03.14

効能又は効果に関連する注意において、「左室駆出率の保たれた慢性心不全における本剤の有効性及び安全性は確立していないため、左室駆出率の低下した慢性心不全患者に投与すること。」とされているので、投与開始に当たっては、左室駆出率の計測年月日及び左室駆出率の値を記載すること。なお、他の医療機関で左室駆出率を測定した場合には、当該測定結果及び医療機関名を記載することで差し支えない。

低アルブミン血症 H27.05.20

★ ペリキューボ錠 2. 5 mg 1錠

点 28回

低ナトリウム血症 H29.12.26

レセプト摘要欄に必要なコメントがありません。

狭心症 H30.02.05

850600082 左室駆出率の計測年月日（ペリキューボ錠2.5mg）；（元号）yy

腎性貧血 H30.06.21

効能又は効果に関連する注意において、「左室駆出率の保たれた慢性心不全における本剤の有効性及び安全性は確立していないため、左室駆出率の低下した慢性心不全患者に投与すること。」とされているので、投与開始に当たっては、左室駆出率の計測年月日及び左室駆出率の値を記載すること。なお、他の医療機関で左室駆出率を測定した場合には、当該測定結果及び医療機関名を記載することで差し支えない。

高リン血症 H30.08.20

閉じる

両側変形性膝関節症 R01.06.04

閉じる

甲状腺腫 R01.09.17

閉じる

慢性心不全 R04.11.02

閉じる

慢性腎不全 R05.08.07

閉じる

廃用性筋萎縮 R05.10.05

閉じる

高尿酸血症 R05.10.05

閉じる

膵炎 R05.10.05

閉じる

統合失調症 R05.10.30

閉じる

維持療法の必要な難治性逆流性食道炎 R05.12.01

閉じる

中等度アルツハイマー型認知症 R05.12.07

閉じる

高β2マイクログロブリン血症 R05.12.20

閉じる